

Pielegnacja kóz



Podstawowe zabiegi w chowie kóz:


- ▶ Korekcja racic
- ▶ Dekoronizacja
- ▶ Znakowanie
- ▶ Usuwanie nadliczbowych strzyków
- ▶ Odrobaczanie
- ▶ Pielęgnacja sierści i skóry
- ▶ Kastracja



Korekcja racic

Korekcja racic jest wymagana u zwierząt utrzymywanych w alkierzowych systemach bez możliwości korzystania z wybiegów na których samoczynnie mogą ścierać podszwę kopyta.

Kontroli racic należy przeprowadzać co 2 miesiące



Brak korekcji prowadzi do:

- ▶ **Deformacji kończyn młodych kózłat**
- ▶ **Wadliwego chodu**
- ▶ **Obniżenia wydajność mlecznej kóz**
- ▶ **Utraty zdolności do krycia maciorek**



Dekoronizacja – usuwanie rogów

- ▶ Zmniejsza agresję w stadzie
- ▶ Ogranicza konkurencję pomiędzy kozłętami
- ▶ Ułatwia obsługę zwierząt

Zabieg należy wykonać w wieku 2 tyg. gdy zawiązka rogów ma ok 6mm najczęściej rozgrzanym urządzeniem przykładanym do zawiązki rogu na 10 sekund.



Sposoby dekaronizacji

- ▶ Wypalanie elektryczne, z zastosowaniem urządzeń do dekaronizacji
- ▶ Stosowanie past dekaronizacyjnych
- ▶ Wypalanie rozgrzanym metalem
- ▶ Wypalanie stężonym ługiem potasowym, kwasem siarkowym lub azotowym



Usuwanie nadliczbowych strzyków

Zabieg wykonuje się zazwyczaj w tym samym okresie co usuwanie rogów (ok 2 tyg.). Polega na odcięciu ostrym nożykiem nadliczbowych strzyków. Powstałą ranę należy zdezynfekować jodyną.



Odrobaczanie

Powinno być wykonywane dwukrotnie w ciągu roku, przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu pastwiskowego.



Pielęgnacja sierści i skóry

- ▶ **Szczotkując** sierść **usuwamy martwe włosy**, **pobudzamy krążenie i przemianę materii** u zwierzęcia
- ▶ Zabieg ten **poprawia mleczność o 5%**
- ▶ **Kozły** w sezonie kopulacyjnym **należy myć ponieważ skrapiają się moczem**
- ▶ Zabiegi te **ograniczają nieprzyjemne zapachy oraz stany zapalne skóry**



Kastracja

Usuwanie jąder u koziołków w celu poprawienia jakości mięsa koziego jak również dobowych przyrostów. Koziołki kastrowanie są spokojniejsze, mniej agresywne. Przy utrzymywaniu grupowym wraz z kózkami eliminujemy nieplanowane ciąży. Minusem kastracji jest zwiększenie ołuszczenia koziołków zbliżone do samic.

Metody kastracji:

- ▶ Bezkrwawa
- ▶ Krwawa



Kastracja bezkrwawa

- ▶ **Miażdżenie nasieniowodów kleszczami „Burdizzo” w wieku do 3 miesięcy**
- ▶ **Zakładanie na mosznę opasek gumowych zaciskających „elastatorów” w wieku do 2 tyg. życia koziołka.**



Kastracja metodą krwawą

Zabieg najskuteczniejszy wykonywany w wieku 2-3 tygodni życia po wcześniejszym znieczuleniu, polegający na chirurgicznym usunięciu jader z moszny przy użyciu „emuskulatora”.

