

Choroby kóz



Zapalenie wymion kozy

Objawy: powiększenie połówki wymienia, zaczerwienienie, bolesność. Mleko staje się wodniste, brązowo-czerwone. Wysoka temperatura – 42 stopni C.

Leczenie podstawowe: W miarę możliwości zdajać ostrożnie wymię, kilkakrotnie w ciągu dnia. Nakładać 2 x dziennie mieszanekę octową i smarować obrzmiatę podbrzusze 2-3 x dziennie balsamem do wymion.



Zranienie strzyków Kozy

Leczenie podstawowe: Smarowanie balsamem do wymion i maścią nagietkową, w przypadku ran ropnych przemywać esencją nagietkową.

Zapobieganie: Zranienie strzyków u kozy jest problemem wynikającym typowo z niewłaściwego przygotowania wybiegu. Kozy, ze względu na swój ruchliwy tryb życia są podatne na okaleczenia, jednak odpowiednie przygotowanie wybiegu w znacznym stopniu może ograniczyć problemy.



Ketoza

Objawy: Stężenie glukozy we krwi obniżone, podwyższona zawartość związków ketonowych (kwas acetooctowy, aceton).

Leczenie: Jeżeli choroba jest już zaawansowana można podawać zastrzyki z glukozy w kilku porcjach (do 500 g dziennie) razem z propionianem sodu w celu wsparcia kuracji dożylniej.

Zapobieganie: Bardzo ważne jest pełnowartościowe żywienie maciorek w drugiej połowie ciąży, z wykluczeniem z diety składników ketogennych, zwłaszcza kiszonki zawierającej kwas masłowy. Pasz treściwa o zawartości 10% białka powinna być podawana początkowo po około 100 g dziennie, a następnie w coraz większych dawkach, w ostatnich 2 tygodniach ciąży 800 ÷ 900 g dziennie.



Zatrucie amoniakiem

Objawy: Osłabienie apetytu, cuchnąca biegunka, brak przeżuwania, dolegliwości wątrobowe, kulawość kończyn tylnych.

Leczenie podstawowe: Natychmiastowa zmiana żywienia! Podawanie wysokoenergetycznych i lekkostrawnych węglowodanów (np. melasa, siekane buraki cukrowe).

Zapobieganie: Polega na przestrzeganiu zasad higieny prawidłowego żywienia i pojenia kóz.



Wzdęcie

Objawy: silne wzdęcie zwłaszcza po lewej stronie ciała, trudności w oddychaniu, niepokój, zataczanie się, śmierć na skutek uduszenia.

Zapobieganie: Zapobieganie wzdęciu polega na pojeniu i podawaniu kozom przed wypasem suchej paszy objętościowej. Należy też unikać karmienia głodnych, nie pojonych zwierząt paszą podatną na gwałtowną fermentację.



Robaczycza żołądkowo-jelitowa u kozy

Objawy: Wywołana jest przez 5 rodzajów pasożytów. Inwazja pasożytami prowadzi do zahamowania rozwoju, chudnięcia, blednięcia śluzówek, obrzmienia gardzieli, braku apetytu, biegunki.

Leczenie podstawowe: Odrobaczanie całego stada na kilka dni przed wypędzeniem na wypas wiosenny.



Tasiemczyca kozy

Objawy: W kale widoczne człony tasiemca. Występuje biegunka, kolka, chudnięcie, czasami wzdęcia brzucha.

Leczenie podstawowe: Działanie przeciwpasożytnicze mają następujące rośliny: czosnek, wrotycz, marchew, rumianek, orlica.



Kulawka kozy

Objawy: Kulawka, inaczej zanokcica, może występować na wszystkich 4 racicach. Ostre bóle powodują silne kulawienie zwierząt. Dochodzi do oddzielenia rogu ściany racicy i rogu podszwy oraz gnicia skóry racicy.

Zapobieganie: Najważniejszym sposobem zapobiegania jest regularna pielęgnacja racic. Zaleca się regularną kąpiel racic w 3-5% roztworze siarczanu miedzi.



Tężyczka kozy

Objawy: Choroba występuje u kóz ciężarnych i w okresie laktacji. Jest ona wywołana niedoborem magnezu we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym manifestującym się klinicznie zaburzeniami nerwowymi. Występuje nagle, po wyjściu zwierząt na pastwisko. Dochodzi do drżenia mięśni, przyspieszenia oddechu oraz skurczów.

Zapobieganie: Przed wypasem należy podawać kozom siano. Powinno się stosować powolne przechodzenie z karmienia zimowego, alkierzowego na wypas pastwiskowy.



Porażenie kozy okołoporodowe

Objawy: Choroba cechuje się obniżeniem poziomu wapnia i fosforu we krwi. W odróżnieniu od ketozy, występuje w ostatnich dniach ciąży lub kilka dni po porodzie. Charakterystyczne jest nagłe wystąpienie choroby, bez wcześniejszych objawów. Dochodzi do drżenia mięśni, później do skurczów.

Zapobieganie: Stosować żywienie, które pokrywa zapotrzebowanie mineralne na magnez i fosfor

