

Higiena żywienia i pojenia zwierząt



Należy zwracać uwagę na utrzymanie czystości:

- ▶ żłobów
- ▶ koryt
- ▶ poideł
- ▶ urządzeń do zadawania pasz.

Resztki pozostawionej paszy szybko ulegają zepsuciu i mogą spowodować poważne zatrucia zwierząt. W czystości należy utrzymywać także magazyny paszowe i pomieszczenia służące do przechowywania paszy.



Pasze podawane zwierzętom nie mogą być spleśniałe

Szczególnie wrażliwe na zepsute pasze są zwierzęta młode oraz ciężarne samice.

Nieprzestrzeganie zasad higieny żywienia jest główną przyczyną biegunk, które u zwierząt młodych prowadzą do padnięć



W zimie nie wolno podawać zwierzętom pasz zmarzniętych

Zwłaszcza kiszonki i okopowe, gdyż mogą być przyczyną poważnych zaburzeń w trawieniu.



Skarmiane pasze nie mogą być zanieczyszczone ziemią

- ▶ Należy tego przestrzegać szczególnie przy sporządzaniu kiszonek w pryzmach i przy ich wybieraniu. Zanieczyszczenie to nie tylko zmniejsza wartość pokarmową, ale może, zwłaszcza u zwierząt młodych, wywołać nieżyt jelit.
- ▶ Nie mogą też pasze zawierać innych ciał obcych, jak gwoździe, opłuki, kawałki drutu itp., gdyż zagraża to zdrowiu, a nawet życiu zwierząt.



Pasze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- ▶ Zabronione jest magazynowanie paszy wraz z środkami chemicznymi, takimi jak nawozy mineralne i środki ochrony roślin (owadobójcze, grzybobójcze), gdyż nawet niewielka ich domieszka grozi zatruciem zwierząt.



Przemysłowe mieszanki paszowe mają zwykle określony okres przechowywania

Bez straty ich wartości pokarmowej zazwyczaj wynosi on 6 miesięcy od daty produkcji.

Do mieszanek tych dodawane są związki biologicznie czynne, takie jak witaminy i inne, które po dłuższym okresie przechowywania tracą swą wartość.



Nie wolno zbierać na paszę roślin poddanych działaniu środków

W szczególności środków owadobójczych, grzybobójczych lub chwastobójczych przed upływem terminu karencji tych środków (to jest okresu ich rozpadu), gdyż mogą spowodować zatrucie zwierząt, często nawet śmiertelne.

Produkty pochodzące od zwierząt, którym podano by taką paszę (mleko, jaja, mięso), są również skażone i mogą spowodować u ludzi zatrucie lub przewlekłe choroby.



WODA

Odgrywa olbrzymią rolę w procesach życiowych zwierząt,

ponieważ jest składnikiem wszystkich komórek organizmu oraz umożliwia mu przyswajanie składników pokarmowych i substancji mineralnych. Niedobór wody powoduje znaczne obniżenie produktywności zwierząt i prowadzi do zaburzeń w procesach rozrodczych.


Bez pożywienia zwierzę może żyć znacznie dłużej niż bez wody.

Otrzymuje ją w postaci wody do picia oraz w paszach zawierających większe lub mniejsze jej ilości.



Zapotrzebowanie na wodę zależy od:

- ▶ Gatunku zwierzęcia
- ▶ Wieku
- ▶ Przynależności do grupy produkcyjnej
- ▶ Ilości i rodzaju pobieranej paszy
- ▶ Temperatury otoczenia zależnej od pory roku, wentylacji, kubatury pomieszczenia i obsady



Sposoby pojenia

Należy pamiętać, że tak niezbędna organizmowi woda może przy nieodpowiednim sposobie pojenia stać się czynnikiem szkodliwym dla zdrowia.

Na przykład przy skarmianiu pasz łatwo pęczniejących lub wzdymających należy poić zwierzęta przed karmieniem, a tylko w razie konieczności — w 3 godziny po karmieniu.



Temperatura wody

Ogólnie przyjmuje się, że temperatura wody do picia dla zwierząt dorosłych powinna wynosić 10—12 °C, a dla młodych musi być jeszcze wyższa. Woda z wodociągów nagrzewa się w rurach, natomiast wodę ze studni w zimie należy nieco ogrzać przez dodanie wrzątku.