

Żywienie i odsadzenie prosiąt



Żywienie prosiąt

U noworodków przewód pokarmowy jest bardzo słabo rozwinięty i doskonalenie trawienia rozwija się stopniowo. Pobierają wyłącznie mleko matki co utrzymuje pH przewodu pokarmowego na poziomie 2 - 3,5. Pasze stałe zmniejszają zakwaszenie i powodują zaburzenia pokarmowe.

Najchętniej zjadana jest pasza w formie granulki 2 - 3mm



Żywienie prosiąt

Jeśli planowane jest szybkie odłączenie prosiąt od lochy to należy stosunkowo jak najwcześniej rozpocząć dokarmianie paszą treściwą.

Mleko już w 2 tygodniu nie pokrywa potrzeb energetycznych a w 4 tygodniu również potrzeby białkowe nie są w pełni pokryte.



Dzienne zapotrzebowanie prosiąt na składniki

Składniki pokarmowe	Prosięta ssące	Prosięta odsadzone	Warchlaki 10 - 30kg
EM MJ	0,5 - 5,0	7,5 - 9,5	15
Białko str. g.	10 - 65	80 - 105	175
Lizyna g.	1 - 5	6 - 8	12
Wapń g.	1 - 4	5 - 7	10
Fosfor g.	1 - 3	4 - 5	7



Udział pasz wchodzących w skład dawki pokarmowej

Surowce paszowe	Udział pasz (%)
Zboża (pszenica, kukurydza, jęczmień, owies)	70
Otręby pszenne	5 - 10
Poekstrakcyjna śruta sojowa	10 - 20
Mleko w proszku, suszona maślanka i serwatka	20
Mączka rybna	5 - 10



Żywienie prosiąt

Od 1 stycznia 2006 roku jest zakaz stosowania antybiotyków paszowych.

W okresie około odsadzeniowym ważne jest aby dodawać do wody substancje zakwaszające w celu obniżenia pH treści pokarmowej co z kolei eliminuje bakterie chorobotwórcze rozwijające się w przewodzie pokarmowym



Aminokwasy egzogenne

Stosunek aminokwasów egzogennych

Lizyny : metioniny : treoniny : tryptofanu

100 : 60 : 62 : 18



Termin odsadzenia prosiąt

- ▶ Według przepisów UE prosięta można odsadzić nie wcześniej jak po 4 tygodniu
- ▶ W 6 tygodniach odsadzać można prosięta z stad hodowlanych
- ▶ W produkcji towarowej 28 - 35 dni
- ▶ Należy uwzględnić ekonomikę produkcji



Odsadzanie prosiąt

- ▶ Masa ciała około **7,5kg**
- ▶ Przy odsadzeniu prosięta muszą potrafić pobierać duże ilości paszy stałej i pić wodę z poidłek automatycznych
- ▶ Odrobaczyć prosięta przed odsadzeniem
- ▶ Dodawać zakwaszacze do paszy lub wody
- ▶ Przez 10 pierwszych dni stosować ograniczone żywienie zwiększając dawkę paszy aby nie doprowadzić obrzękówki



Schemat żywienia prosiąt

