

Użytkowanie rozpłodowe kóz



Rozród kóz

- ▶ Dojrzałość płciowa – 4-6m-cy
- ▶ Dojrzałość rozplodowa – 7-8m-cy (30 – 35kg masy ciała)
- ▶ Koziołki – dojrzałość rozplodowa 8m-cy przy masie ciała 40kg
- ▶ Ruja sezonowa – sierpień – listopad



Objawy rui:

- ▶ Niepokój
- ▶ Obrzmienie warg sromowych
- ▶ Wyptyw śluzu z pochwy ze śladami krwi
- ▶ Nastroszone włosy na grzbiecie
- ▶ Zwiększony lub obniżony apetyt
- ▶ Częstsze meczenie
- ▶ Częstsze oddawanie moczu
- ▶ Merdanie ogonem, szczególnie po dotknięciu okolic lędźwi
- ▶ Obskakiwanie innych kóz, pozwala się sama obskakiwać



Ruja kóz

- ▶ Ruja 1-3 dni, średnio 36h
- ▶ Owulacja w 30 – 36h po wystąpieniu pierwszych objawów rui
- ▶ Krycie w 6-12h od początku rui, powtórne po 16 – 24h od pierwszego
- ▶ Cykl rujowy 21 dni
- ▶ Ciche ruje



Stanówka kóz

- ▶ Krycie z ręki, haremowe
- ▶ 40 dni
- ▶ Wydzielanie feromonów (wydzielina gruczołów łojowych i potowych)



Ciąża

- ▶ 147 – 153 średnio 150dni
- ▶ Zasuszenie na 2 miesiące przed porodem
- ▶ poronienia



Poród – oznaki:

- ▶ Zwiótczenie więzadeł macicy
- ▶ Obrzęk sromu z wypływem śluzu
- ▶ Powiększenie wymienia
- ▶ Pojawienie się siary
- ▶ Utrata apetytu
- ▶ Niepokój i nadmierna ruchliwość
- ▶ Częste beczenie



Poród – fazy:

- ▶ Skurcze macicy z bólami porodowymi
- ▶ Pojawienie się pęcherza płodowego
- ▶ Pękanie błon płodowych i wypłynięcie wód płodowych
- ▶ Wyparcie koźlęcia do 2h
- ▶ Wyparcie łożyska



Postępowanie z noworodkiem

- ▶ Podsuniecie koźlęcia matce do wylizania
- ▶ Podanie siary
- ▶ Podanie ciepłego pójła matce
- ▶ Znakowanie koźląt

