

Odchów koźląt



Sposoby odchowów koźląt:

- ▶ Naturalny
- ▶ Sztuczny



Naturalny odchów koźląt

- ▶ Trwa 6-7m-cy
- ▶ Koźłeta przebywają z matkami i w koziarni i na pastwisku
- ▶ Do 100g pasz treściwych na dzień
- ▶ Nie można ocenić tempa wzrostu koźląt, zdrowotności, występuje konkurencja między młodymi, ciągle są ranione strzyki matek
- ▶ **Masa ciała odsadzanych zwierząt ok 10 – 15kg**



Sztuczny odchów koźląt

- ▶ 12 tyg., czasem skrócony do 6-7tyg.
- ▶ Okres pojenia mlekiem min. 4-5tyg.
- ▶ Owies gnieciony i siano od 3 tyg. Życia
- ▶ od 10tyg. Żywienie pastwiskowe



Sztuczny odchów koźląt

- ▶ W trakcie odchowu na jedno koźlą należy przeznaczyć około **130-160 litrów mleka lub pójła i około 10 kg mieszanki treściwej**.
- ▶ Ze względów ekonomicznych pożądane jest wczesne kończenie odpajania mlekiem, jednak muszą być spełnione następujące warunki:
 - ▶ **masa ciała koźląt musi przekraczać 8 kg**
 - ▶ **dziennie pobranie paszy treściwej – 50–100 g**
 - ▶ **natomiast dziennie pobranie siana –100 g**



Przykładowe żywienie kozłat w pierwszych 12 tygodniach życia
Sample feeding for kids during the first 12 weeks of age

Wiek <i>Age</i>	Ilość od- pasów <i>No. of feedings</i>	Dziennie (litry) <i>Daily (litres)</i>	Mleko - <i>Milk</i>	FERNANDO Pasza treściwa	Siano <i>Hay</i>	Kiszonka Zielonka Okopowe <i>Silage Forage Roots</i>
dzień - day						
1	5 - 6	0,6	siara - <i>colostrum</i>			
2	5 - 6	0,7				
3	5 - 6	0,8				
4	4 - 5	0,9	siara, mleko <i>colostrum, milk</i>			
5-7	3 - 5	1,1-1,5	MLEKOTEK	FERNANDO		
tydzień - week						
2	2-4	2,0-2,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	
3	2-3	2,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	
4	2-3	2,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
5	2-3	2,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
6	2	2,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
7	2	2,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
8	2	2,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
9	2	2,0	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
10	2	1,5	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
11	2	1,0	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+
12	2	1,0	MLEKOTEK	FERNANDO	+	+



Odpajanie koźląt

Utrzymanie **3 odpasów zamiast 2 pozwala** na podanie mniejszych ilości mleka jednorazowo; jest to ważne, ponieważ **do 6-8 tygodnia życia funkcjonuje tzw. „rynienka przełykowa”**, która zapobiega przedostawaniu się mleka do przed- żołądków i jest odpowiedzialna za bezpośredni transport mleka do trawieńca, czyli żołądka właściwego. **Trawieniec ma niestety ograniczoną objętość, stąd podając jednorazowo większą ilość mleka można doprowadzić do przekarmienia i biegunki.** Jeśli koźłeta nie wypiją jednorazowo **więcej niż 0,3-0,5 litra mleka**, łatwo można uzupełnić powstały niedobór przy następnym odpajaniu.

