


Utrzymanie loch karmiących i prosiąt


Warunki w kojcu porodowym

- ▶ Kontrola - co najmniej raz dziennie
- ▶ Dostęp do wody i paszy
- ▶ Umożliwienie budowania gniazda


Kojce porodowe dla loch



A. Kojec dwudzielny
(barierki ochronne w części legowiskowej lochy)



B. Kojec trójdzielny
klatka lochy unoszona do góry



C. Kojec trójdzielny z ruchomymi przegrodami klatki
locha w klatce porodowej



locha odzyskała swobodę ruchu

Klatka dwudzielna

- ▶ Wymiary - 1,8m szerokości, 2,3 - 2,4 długości (z regulacją)
- ▶ Wyposażenie:
 - źródło ciepła: (promiennik lub mata grzewcza)
 - Poidło i koryto dla lochy
 - Korytko i poidelko dla prosiąt

Utrzymanie grupowe loch karmiących

- ▶ Tylko wtedy, gdy na fermie stosowana jest synchronizacja rui
- ▶ Po 10 - 14 dniach po porodzie przegrody są zdejmowane
- ▶ Łączenie 5 - 8 miotów

Ściółka w kojcu porodowym

- ▶ Właściwa izolacja termiczna
- ▶ Brak urazów
- ▶ Komfort legowiskowy
- ▶ Korzystny wpływ na kończyny

Warunki utrzymania prosiąt

- ▶ Temperatura: 22 - 30C
- ▶ Wilgotność: 60%
- ▶ Powierzchnia podłogi: 0,15m² na sztukę
- ▶ Oświetlenie dzienne: 1:25